

Zasady pracy pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej w czasie zagrożenia epidemicznego

Zasady obowiązują od dnia 01.09.2020 r.

1. Gabinet profilaktyczny jest wyposażony w środki do dezynfekcji powierzchni, środek do dezynfekcji rąk, rękawice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, maski z filtrem FFP2 lub FFP3, okulary ochronne lub przyłbice, fartuchy flizelinowe ochronne, fartuchy barierowe wodoodporne.
2. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym powinien przebywać tylko jeden uczeń, który powinien mieć założoną maseczkę jednorazową, zdezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do gabinetu. Pielęgniarka dokonuje pomiaru temperatury.
3. W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: realizacja testów przesiewowych, sprawowanie opieki poprzesiewowej oraz czynne poradnictwo nad uczniami z problemami zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.
4. Wszystkie realizowane przez pielęgniarkę porady należy udokumentować w zeszycie pomocy przedlekarskiej oraz w indywidualnej dokumentacji ucznia z zaznaczeniem daty i godziny wizyty.
5. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruc oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym w ramach realizacji świadczeń pielęgniarskich, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk. Powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.

6. Realizowany przez pielęgniarkę program edukacji zdrowotnej, powinien poza standardowymi treściami, zawierać przede wszystkim zasady minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusowych w tym infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.
7. W kontaktach bezpośrednich innych (innych, niż udzielanie świadczeń zdrowotnych) należy przestrzegać dystansu min. 1,5- 2 m. W kontaktach z gronem pedagogicznym, rodzicami w miarę możliwości minimalizować kontakty bezpośrednie zmieniając je na porady telefoniczne. W kontaktach bezpośrednich należy stosować maskę chirurgiczną.
8. Z gabinetu profilaktycznego należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty i sprzęty, których nie można dezynfekować, przestrzegając zasady „czystego biurka”.
9. Gabinet należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, lub częściej w uzasadnionych przypadkach.
10. Należy dezynfekować powierzchnie- w tym m.in. dezynfekcja blatów, klamek, używanego sprzętu medycznego, telefonu z częstotliwością 2 razy dziennie (zgodnie z procedurą sprzątania gabinetu profilaktycznego).
11. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji, sugerujących podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2- tj. gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszel duszność, inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych, należy skierować ucznia do izolatki lub pomieszczenia z zapewnieniem co najmniej 2m odległości od innych osób. Ucznia należy odizolować do czasu przybycia opiekuna. W przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej należy zadzwonić pod 112 dyspozytor podejmie decyzję o transporcie dedykowanym transporterem „COVID-19”. Pielęgniarka powinna zalecić uczniowi szkoły założenie maseczki. Należy bezzwłocznie powiadomić opiekunów dziecka oraz zalecić kontakt z odpowiednim Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który pokieruje dalszym postępowaniem. Zgłoszenie telefoniczne podejrzenia zakażenia do Powiatowego Inspektora Sanitarnego dokonuje Dyrektor Szkoły lub osoba przez Niego wyznaczona. Sposób postępowania z osobami z kontaktu określa Powiatowy Inspektor Sanitarny, z którym pielęgniarka i Dyrektor szkoły powinni być w kontakcie i realizować Jego zalecenia.
12. Podczas udzielania świadczeń u ucznia, u którego objawy sugerują podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-Co-2, pielęgniarka poza

rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska z filtrem FFP2 lub FFP3, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch barierowy wodoodporny.

13. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego nie rekomenduje stosowania u dzieci profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych.
14. W przypadku wystąpienia u pielęgniarki będącej na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć się od pracy, wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić Dyrektora Szkoły, Dyrektora NZOZ Centrum Medycyny Szkolnej oraz właściwą miejscowo Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.
15. Obszar, w którym poruszała się i przebywała pielęgniarka, należy poddać gruntownemu sprzątnięciu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami.